

Smitsomme sygdomme der kræver at barnet er hjemme i kortere eller længere tid

Sygdom	Barnet må komme i Institutionen
Halsbetændelse (bakteriel)	Såfremt barnet er feberfrit og almentilstanden tillader til.
Skarlagensfeber	Såfremt barnet er feberfrit og almentilstanden tillader det.
Børnesår	Når de tørre skorper er faldet af.
Skoldkopper	Når skorperne er tørret ind, er smittefaren overstået.
Diaré	Når barnet er rask og afføringen har form.
Opkast ved Sygdom	Når barnet ikke har opkast og almentilstanden tillader det.
Kighost	Når hosteanfald ikke giver anledning til problemer for barnet i institutionen.
MRSA(resistent gule stafylokokker)	Når man er rask, ikke har sår, bylder eller akut luftvejsproblemer.
Svær Øjenbetændelse (virus eller bakterier)	Efter mindst 2 døgn behandling og når symptomerne er forsvundet. Symptomer på svær øjenbetændelse; hvis der er stærkt pusflåd, hvis der er tydelig lysskyhed og hvis barnet almen tilstand er påvirket.
Lussinge syge	Når barnet er rask.
Hånd-, fod-og mundsyge	Når barnet er rask.
Influenza	Når barnet er rask.
Tredagsfeber	Når barnet er rask.
Feber 38 g og derover	Når barnet er rask.
Lus	Når behandling er igangsat.

Rask; det vil sige når barnet ingen feber har og/eller barnets almene tilstand tillader det-Barnet skal kunne deltage i de almindelige aktiviteter uden forholdsregler.

Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside under; smitsomme sygdomme hos børn og unge eller på hjemmesiden "syge børn" under; sygdomme og daginstitution/dagpleje